Homotopía racional...
¡pero si es muy fácil!

Los grupos de homotopía son muy difíciles de calcular.

Jean Pierre Serre

Teorema

Cada grupo de homotopía de un complejo finito 1-conexo es finitamente generado.

$$\pi_n(X) \otimes \mathbb{Q} = \bigoplus_r \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} = \bigoplus_r \mathbb{Q}, \quad n > 1. \quad 1.$$

$$rk(\pi_n(X)) = r = \dim \pi_n(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

La homotopía racional estudia la parte libre de torsión de la homotopía de los espacios:

I.- Dado un espacio X , construir un nuevo espacio $X_{\mathbb{Q}}$, llamado el *racionalizado* de X , que satisfaga:

$$\pi_*(X_{\mathbb{Q}}) = \pi_*(X) \otimes \mathbb{Q}.$$

P. Hilton, G. Mislin, J. Roitberg, M. Postnikov,...

II.- Encontrar modelos algebraicos que representen fielmente a $X_{\mathbb{Q}}$. Para ello es clave la introducción de formas diferenciales en un espacio topológico X .

Dennis Sullivan

Daniel Quillen

Sea X un espacio topológico

$$A(X) = \bigoplus_{p \geq 0} A^p(X)$$

Una p -forma diferencial $\Phi \in A^p(X)$ es una familia de p -formas diferenciales "compatibles":

$$\{\Phi_\sigma \in A^p(\sigma), \sigma \text{ s\u00edmplex de } X\}$$

El producto y la derivada exterior hacen de $A(X)$ un \u00e1lgebra graduada diferencial conmutativa.

Las formas diferenciales polinomiales sobre X , $A_{PL}(X)$, es la sub\u00e1lgebra de $A(X)$ generada por $\mathbb{Q}$ y las funciones coordenadas.

$A_{PL}(X)$ es un álgebra “muy grande” y puede ser simplificada: existe un morfismo de álgebras que induce isomorfismo en cohomología

$$\varphi: (\Lambda V, d) \xrightarrow{\cong} A_{PL}(X)$$

donde $(\Lambda V, d)$ es el álgebra libre generada por el espacio vectorial V (polinomios en V con coeficientes racionales) y la diferencial d satisface la siguiente condición de minimalidad: para cada $v \in V$, dv es un polinomio en ΛV sin término lineal.

$(\Lambda V, d)$ es el *modelo minimal* de X .

Teorema

El modelo minimal de un espacio no sólo es un invariante del tipo de homotopía racional de X sino que lo caracteriza.

$$X_{\mathbb{Q}} \longleftrightarrow (\Lambda V, d)$$

Teorema

Sea $(\Lambda V, d)$ el modelo minimal de X . Entonces:

$$H^*(X; \mathbb{Q}) \cong H^*(\Lambda V, d),$$

$$\pi_*(X) \otimes \mathbb{Q} \cong V,$$

...

El rango de los grupos de homotopía de un espacio compacto no se dispone al azar:

Yves Félix

Stephen Halperin

Teorema: dualidad Elíptico-Hiperbólica

Dado un espacio compacto X , existen sólo dos posibilidades:

- (i) $\pi_*(X) \otimes \mathbb{Q}$ es de dimensión finita.
- (ii) $\pi_*(X) \otimes \mathbb{Q}$ crece exponencialmente: Existe una constante $c > 1$ y un entero positivo n_0 tal que para cada $k \geq n_0$

$$\sum_{i=1}^k \dim \pi_i(X) \otimes \mathbb{Q} \geq c^k.$$

Teorema

Sea X un espacio compacto con $\dim X = m$. Entonces:

- (i) Si X es elíptico, $\pi_i(X) \otimes \mathbb{Q} = 0$, $i \geq 2m$.
- (ii) Si X es hiperbólico, en cada intervalo de $\mathbb{N}$ de longitud m existe algún i con $\pi_i(X) \otimes \mathbb{Q} \neq 0$.

Propiedades de los espacios elípticos

Sea X un espacio elíptico. Entonces:

- $\chi(X) \geq 0$.
- $\chi_\pi(X) = \sum_{i \geq 1} (-1)^i \dim \pi_i(X) \otimes \mathbb{Q} \leq 0$.
- $H^*(X; \mathbb{Q})$ es un álgebra con dualidad de Poincaré.

Conjetura de Anick

Todo espacio compacto de dimensión k es el k -esqueleto de un espacio elíptico.

David Anick

Teorema

La conjetura de Anick es cierta si los invariantes de Postnikov de orden par son descomponibles:

$$k_n \in H^+(X^{(n-1)}; \mathbb{Q}) \cdot H^+(X^{(n-1)}; \mathbb{Q}) \otimes \pi_n X, \quad n \text{ par.}$$

Yves Félix

Barry Jessup

Y un servidor

Teorema

Sea X un espacio con $\pi_*(X) \otimes \mathbb{Q}$ de dimensión finita. Entonces $H^*(X; \mathbb{Q})$ es noetheriana si y sólo si existe una fibración

$$F \longrightarrow E \xrightarrow{p} X$$

donde E es elíptico y F es un producto finito de esferas de dimensión impar.